

R-CHOP 療法

適応疾患	適応分類	1コースの日数	催吐性リスク
悪性リンパ腫	進行再発	21 日	高度

抗がん剤	投与量	投与日
シクロホスファミド	750 mg/m ²	day 1
ドキシソルビシン	50 mg/m ²	day 1
ビンクリスチン	1.4 mg/m ²	day 1
リツキシマブ	375 mg/m ²	day 1
プレドニゾン	100 mg	day 1 -5

投与日	薬剤名	投与量	投与時間
day 1	Rp. 1 生理食塩水	100 mL	
	Rp. 2 パロノセトロンバック d-クロルフェニラミン プレドニゾン	0.75 mg/50mL 5 mg 100 mg	15 分
	Rp. 3 5%ブドウ糖液 シクロホスファミド	250 mL 750 mg/m ²	60 分
	Rp. 4 生理食塩水 ドキシソルビシン	50 mL 50 mg/m ²	5 分
	Rp. 5 生理食塩水 ビンクリスチン	50 mL 1.4 mg/m ² (最大 2mg/body)	5 分
	Rp. 6 生理食塩水 リツキシマブ 初回は50mL/hrから開始、30分毎に50mL/hrずつ速度アップ可 (最大400mL/hr)	250~700 mL 375 mg/m ²	90 分
day 2 -5	プレドニゾン	100 mg	内服

制吐薬 (内服)

制吐薬適性使用ガイドラインに準じて使用
