

NIVO+mFOLFOX6 療法

適応疾患	適応分類	1コースの日数	催吐性リスク
胃がん	進行再発	14 日	中等度

抗がん剤	投与量	投与日
ニボルマブ	240 mg	day 1
レボホリナート	200 mg/m ²	day 1
オキサリプラチン	85 mg/m ²	day 1
フルオロウラシル	400 mg/m ²	day 1
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day 1, 2

投与日	薬剤名	投与量	投与時間
day 1	Rp. 1 生理食塩水	10 mL	
	Rp. 2 生理食塩水	100 mL	
	Rp. 3 生理食塩水 ホスアプレピタント	100 mL 150 mg	30 分
	Rp. 4 パロノセトロンバック デキサメタゾン	0.75 mg/50mL 6.6 mg	30 分
	Rp. 5 生理食塩水 ニボルマブ	100 mL 240 mg	30 分
	Rp. 6 生理食塩水	50 mL	ラインフラッシュ
	Rp. 7 5%ブドウ糖液 レボホリナート	250 mL 200 mg/m ²	120 分
	Rp. 8 5%ブドウ糖液 オキサリプラチン (レボホリナートと同時に点滴)	250 mL 85 mg/m ²	120 分
	Rp. 9 生理食塩水 フルオロウラシル	50 mL 400 mg/m ²	5 分
	Rp. 10 生理食塩水 フルオロウラシル	100 mL 2400 mg/m ²	46 時間

制吐薬（内服）

制吐薬適性使用ガイドラインに準じて使用
