

## AFL+FOLFIRI 療法

| 適応疾患 | 適応分類 | 1コースの日数 | 催吐性リスク |
|------|------|---------|--------|
| 大腸がん | 進行再発 | 14 日    | 中等度    |

| 抗がん剤        | 投与量                    | 投与日      |
|-------------|------------------------|----------|
| アフリベルセプトベータ | 4 mg/kg                | day 1    |
| レボホリナート     | 200 mg/m <sup>2</sup>  | day 1    |
| イリノテカン      | 150 mg/m <sup>2</sup>  | day 1    |
| フルオロウラシル    | 400 mg/m <sup>2</sup>  | day 1    |
| フルオロウラシル    | 2400 mg/m <sup>2</sup> | day 1, 2 |

| 投与日   | 薬剤名  | 投与量                              | 投与時間     |
|-------|--|----------------------------------|----------|
| day 1 | Rp. 1 生理食塩水                                | 10 mL                            |          |
|       | Rp. 2 生理食塩水                                | 100 mL                           |          |
|       | Rp. 3 生理食塩水<br>ホスアブレピタント                   | 100 mL<br>150 mg                 | 30 分     |
|       | Rp. 4 生理食塩水<br>パロノセトロン<br>デキサメタゾン          | 50 mL<br>0.75 mg<br>6.6 mg       | 30 分     |
|       | Rp. 5 生理食塩水<br>アフリベルセプトベータ                 | 100 mL<br>4 mg/kg                | 60 分     |
|       | Rp. 6 生理食塩水                                | 50 mL                            | ラインフラッシュ |
|       | Rp. 7 5%ブドウ糖液<br>レボホリナート                   | 250 mL<br>200 mg/m <sup>2</sup>  | 120 分    |
|       | Rp. 8 5%ブドウ糖液<br>イリノテカン<br>(レボホリナートと同時に点滴) | 250 mL<br>150 mg/m <sup>2</sup>  | 120 分    |
|       | Rp. 9 生理食塩水<br>フルオロウラシル                    | 50 mL<br>400 mg/m <sup>2</sup>   | 5 分      |
|       | Rp. 10 生理食塩水<br>フルオロウラシル                   | 100 mL<br>2400 mg/m <sup>2</sup> | 46 時間    |

制吐薬（内服）

制吐薬適性使用ガイドラインに準じて使用