

ペムブロリズマブ+PTX 療法 3週法

適応疾患	適応分類	1コースの日数	催吐性リスク
乳がん	進行再発	84 日	軽度

抗がん剤	投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg	day 1, 22, 43, 64
パクリタキセル	90 mg/m <sup>2</sup>	day 1, 8, 15, 29, 36 day 43, 57, 64, 71

投与日	薬剤名	投与量	投与時間
下記を参照	Rp. 1 生理食塩水	100 mL	30 分
	Rp. 2 生理食塩水 ペムブロリズマブ	100 mL 200 mg	
	Rp. 3 生理食塩水	50 mL	ラインフラッシュ
	Rp. 4 生理食塩水 ファモチジン デキサメタゾン d-クロルフェニラミン	100 mL 20 mg 9.9 mg 5 mg	15 分
	Rp. 5 5%ブドウ糖液 パクリタキセル	250 mL 90 mg/m <sup>2</sup>	60 分

制吐薬（内服）

制吐薬適性使用ガイドラインに準じて使用

	1	8	15	22	29	36	43	50	57	64	71	78
ペムブロリズマブ	○			○			○			○		
パクリタキセル	○	○	○		○	○	○		○	○	○	