

ペムプロリズマブ+GEM+CBDCA 療法 6週法

適応疾患	適応分類	1コースの日数	催吐性リスク
乳がん	進行再発	42 日	中等度

抗がん剤	投与量	投与日
ペムプロリズマブ	400 mg	day 1
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	day 1, 8, 22, 29
カルボプラチン	AUC=2	day 1, 8, 22, 29

投与日	薬剤名	投与量	投与時間
day 1	Rp. 1 生理食塩水	100 mL	
	Rp. 2 生理食塩水 ペムプロリズマブ	100 mL 200 mg	30 分
	Rp. 3 生理食塩水	50 mL	ラインフラッシュ
	Rp. 4 グラニセトロン デキサメタゾン	3 mg/100mL 9.9 mg	15 分
	Rp. 5 生理食塩水 ゲムシタビン	100 mL 1000 mg/m ²	30 分
	Rp. 6 5%ブドウ糖液 カルボプラチン	250 mL AUC=2	60 分
day 8, 22, 29	Rp. 1 生理食塩水	100 mL	
	Rp. 2 グラニセトロン デキサメタゾン	3 mg/100mL 9.9 mg	15 分
	Rp. 3 生理食塩水 ゲムシタビン	100 mL 1000 mg/m ²	30 分
	Rp. 4 5%ブドウ糖液 カルボプラチン	250 mL AUC=2	60 分

制吐薬（内服）

制吐薬適性使用ガイドラインに準じて使用
