

GEM+CDDP 療法

適応疾患	適応分類	1コースの日数	催吐性リスク
非小細胞肺癌	進行再発	21 日	高度

抗がん剤	投与量	投与日
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	day 1, 8
シスプラチン	80 mg/m ²	day 1

投与日	Rp	薬剤名	投与量	投与時間
day 1	Rp. 1	生理食塩水	100 mL	
	Rp. 2	生理食塩水 塩化カリウム 硫酸Mg補正液	500 mL 10 mEq 10 mEq	90 分
	Rp. 3	パロノセトロンバック ホスネツピタント デキサメタゾン	0.75 mg/50mL 235 mg 9.9 mg	30 分
	Rp. 4	生理食塩水 ゲムシタビン	100 mL 1000 mg/m ²	30 分
	Rp. 5	D-マンニトール・D-ソルビトール	300 mL	30 分
	Rp. 6	生理食塩水 シスプラチン	500 mL 80 mg/m ²	60 分
	Rp. 7	ブドウ糖-電解質液(維持液)	500 mL	90 分
day 8	Rp. 1	生理食塩水	100 mL	
	Rp. 2	生理食塩水 デキサメタゾン	50 mL 6.6 mg	15 分
	Rp. 3	生理食塩水 ゲムシタビン	100 mL 1000 mg/m ²	30 分

制吐薬 (内服)

制吐薬適性使用ガイドラインに準じて使用
