

ニボルマブ+イピリムマブ+PEM+CDDP 療法

適応疾患	適応分類	1コースの日数	催吐性リスク
非小細胞肺癌	進行再発	42	高度

抗がん剤	投与量	投与日
ニボルマブ	360 mg	day 1, 22
イピリムマブ	1 mg/kg	day 1
ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	day 1, 22
シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	day 1, 22

投与日	薬剤名	投与量	投与時間
day 1	Rp. 1 生理食塩水	100 mL	30 分
	Rp. 2 生理食塩水 ニボルマブ	100 mL 360 mg	
	Rp. 3 生理食塩水	50 mL	
	Rp. 4 生理食塩水 イピリムマブ	50 mL 1 mg/kg	
day 1, 22	Rp. 5 生理食塩水	50 mL	ラインフラッシュ
	Rp. 6 生理食塩水 塩化カリウム 硫酸Mg補正液	500 mL 10 mEq 10 mEq	90 分
	Rp. 7 パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン	0.75 mg/50mL 235 mg 9.9 mg	30 分
	Rp. 8 生理食塩水 ペメトレキセド	100 mL 500 mg/m <sup>2</sup>	10 分
	Rp. 9 D-マンニトール・D-ソルビトール	300 mL	30 分
	Rp. 10 生理食塩水 シスプラチン	500 mL 75 mg/m <sup>2</sup>	60 分
	Rp. 11 ブドウ糖-電解質液(維持液)	500 mL	90 分

制吐薬（内服）

制吐薬適性使用ガイドラインに準じて使用
---------------------