

FP 療法 (低用量)

適応疾患	適応分類	1コースの日数	催吐性リスク
食道がん	進行再発	28 日	高度

抗がん剤	投与量	投与日
フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	day 1 - 5, 8 - 12
シスプラチン	40 mg/m <sup>2</sup>	day 1, 8

投与日	薬剤名	投与量	投与時間
day 1, 8	Rp. 1 生理食塩水	100 mL	
	Rp. 2 生理食塩水 塩化カリウム 硫酸Mg補正液	500 mL 10 mEq 10 mEq	90 分
	Rp. 3 パロノセトロンバック ホスネツピタント デキサメタゾン	0.75 mg/50mL 235 mg 9.9 mg	30 分
	Rp. 4 D-マンニトール・D-ソルビトール	300 mL	30 分
	Rp. 5 生理食塩水 フルオロウラシル	500 mL 400 mg/m <sup>2</sup>	24 時間
	Rp. 6 生理食塩水 シスプラチン	500 mL 40 mg/m <sup>2</sup>	60 分
	Rp. 7 酢酸リンゲル液	1000 mL	240 分
day 2, 3 9, 10	Rp. 1 生理食塩水	100 mL	
	Rp. 2 生理食塩水 フルオロウラシル	500 mL 400 mg/m <sup>2</sup>	24 時間
	Rp. 3 生理食塩水 デキサメタゾン	50 mL 6.6 mg	15 分
	Rp. 4 酢酸リンゲル液	1000 mL	240 分
day 4, 5 11, 12	Rp. 1 生理食塩水	100 mL	
	Rp. 2 生理食塩水 フルオロウラシル	500 mL 400 mg/m <sup>2</sup>	24 時間
	Rp. 3 生理食塩水 デキサメタゾン	50 mL 6.6 mg	15 分

制吐薬 (内服)

制吐薬適性使用ガイドラインに準じて使用
---------------------