

ステップ名称		入院 1 日目～		
		1日目	2日目	3日目
患者状態		<ul style="list-style-type: none"> ■ 掻痒感の症状・所見がない ・ 掻痒感がない ■ 皮膚の状態に問題がない ・ 疼痛がない 		
知識・教育・理解				
治療	処置	持参薬指示 常用薬の確認		
		バイタル測定	⇒ バイタル測定	⇒ バイタル測定
		・軟膏処置	⇒ ・軟膏処置	⇒ ・軟膏処置
		皮膚科 アレルギーチェック		
	注射	250mgピクロックス点滴静注 100mL大塚生食注	250mgピクロックス点滴静注 100mL大塚生食注	250mgピクロックス点滴静注 100mL大塚生食注
		250mgピクロックス点滴静注 100mL大塚生食注	250mgピクロックス点滴静注 100mL大塚生食注	250mgピクロックス点滴静注 100mL大塚生食注
			250mgピクロックス点滴静注 100mL大塚生食注	250mgピクロックス点滴静注 100mL大塚生食注
内服				
検査				
検査	<ul style="list-style-type: none"> ● T Bi I ● AST (GOT) ● ALT (GPT) ● LDH ● γGTP ● TP ● Alb ● BUN ● Cre ● Na ● K ● Cl ● CRP ● 血糖 ● 血算 ● 血液像 			
画像検査				
リハビリ				
栄養				
清潔	・シャワー浴可 汎発性帯状疱疹は全身清拭	⇒ ・シャワー浴可 汎発性帯状疱疹は全身清拭	⇒ ・シャワー浴可 汎発性帯状疱疹は全身清拭	
活動	安静度 院内フリー	⇒ 安静度 院内フリー	⇒ 安静度 院内フリー	
	汎発性帯状疱疹は退院まで感染個室隔離	⇒ 汎発性帯状疱疹は退院まで感染個室隔離	⇒ 汎発性帯状疱疹は退院まで感染個室隔離	
排泄				
観察項目	掻痒感 疼痛 発赤	⇒ 掻痒感 疼痛 発赤	⇒ 掻痒感 疼痛 発赤	
指導・説明	・入院診療計画書説明			
	・パス説明			
	・入院時オリエンテーション			
	・転倒転落アセスメントシート説明			

6日目			入院7日目(退院)
4日目	5日目	6日目	7日目
			<ul style="list-style-type: none"> ■治療について理解できる ・外来受診の必要性を言える
			<ul style="list-style-type: none"> ■自己管理ができる ・継続治療の必要性を言える
			<ul style="list-style-type: none"> ■日常生活の注意点について理解できる ・退院後の生活に対する不安の訴えがない
▶ バイタル測定	▶ バイタル測定	▶ バイタル測定	▶ バイタル測定
▶ ・軟膏処置	▶ ・軟膏処置	▶ ・軟膏処置	▶ ・軟膏処置
250mgピクロックス点滴静注 100mL大塚生食注	250mgピクロックス点滴静注 100mL大塚生食注	250mgピクロックス点滴静注 100mL大塚生食注	
250mgピクロックス点滴静注 100mL大塚生食注	250mgピクロックス点滴静注 100mL大塚生食注		
250mgピクロックス点滴静注 100mL大塚生食注	250mgピクロックス点滴静注 100mL大塚生食注		
		パルトレックス錠500mg	
			<ul style="list-style-type: none"> ● T Bil ● AST (GOT) ● ALT (GPT) ● ALP ● γGTP ● TP ● BUN ● Cre ● Na ● K ● Cl ● CRP ● 血算 ● 血液像
▶ ・シャワー浴可 ・汎発性帯状疱疹は全身清拭	▶ ・シャワー浴可 ・汎発性帯状疱疹は全身清拭	▶ ・シャワー浴可 ・汎発性帯状疱疹は全身清拭	▶ ・シャワー浴可 ・汎発性帯状疱疹は全身清拭
▶ 安静度 院内フリー	▶ 安静度 院内フリー	▶ 安静度 院内フリー	▶ 安静度 院内フリー
▶ 汎発性帯状疱疹は退院まで感染個室隔離	▶ 汎発性帯状疱疹は退院まで感染個室隔離	▶ 汎発性帯状疱疹は退院まで感染個室隔離	▶ 汎発性帯状疱疹は退院まで感染個室隔離
▶ 掻痒感 疼痛 発赤	▶ 掻痒感 疼痛 発赤	▶ 掻痒感 疼痛 発赤	▶ 掻痒感 疼痛 発赤
			▶ 退院療養計画書の説明
			▶ 外来受診日、内服薬、外用薬の説明