

ステップ名称		入院日		手術当日		
		1日目		2日目		3日目
		術前日		術前	術後	術後1日目
患者状態			■合併症の症状・所見がない ・出血がない ・胆管炎症状がない			
知識・教育・理解		■手術について理解できる ・オリエンテーション内容を言える ・手術・麻酔に対する不安の訴えがない ・必要性が理解できる				
治療	処置		術前指示 膈処置 術前指示 剃毛		術室後3時間で水分可	ドレナージ管理 2日目を降 ドレイン抜去
					心電図モニター装着（術翌日朝まで）	心電図モニター装着（術翌日朝まで）
					尿測 3時間毎	尿測 3時間毎
					酸素吸入 酸素マスクor酸素カニューラ（麻）	酸素吸入 酸素マスクor酸素カニューラ（麻）
					酸素吸入（ポンベ） 酸素カニューラ 酸素マスク	膀胱留置カテーテル抜去
					フットポンプ装着 弾性ストッキング着用	フットポンプ除去 弾性ストッキング除去
	注射			ソリュージェンF500ml（2件目～の手術の場合）	アクメイン注500ml 500mlソルテム3A輸液 500mlソルテム3A輸液	
		内服			200mgセレコックス錠 500mgカロナル錠	200mgセレコックス錠
	検査					●CPK ●AST (GOT) ●ALT (GPT) ●LDH ●ALP ●γGTP ●TP ●Alb ●T Bil ●D Bil ●血算 ●BUN ●Cre ●Na ●K ●Cl ●AMY ●CRP ●血糖
	画像検査			【手術室】 イメージ胆道		【回診】 胸部 臥位正面 【回診】 腹部 正面（臥位）
	リハビリ					
栄養			朝から 朝：絶食 昼：絶食 タ：絶食			朝から 朝：絶食 昼：全朝食 タ：パス適用前の食事を引用
清潔		清潔ケア シャワー浴		清潔ケア 洗面	清潔ケア 洗面 清潔ケア 清拭 全身 清潔ケア 病衣交換	
活動		安静度 院内フリー	安静度 院内フリー	安静度 絶対安静	安静度 病棟内フリー	
排泄						
観察項目				嘔気 嘔吐 出血（創部） 腸蠕動音 排ガス		嘔気 嘔吐 出血（創部） 腸蠕動音 排ガス
				疼痛程度（NRS）		疼痛程度（NRS）
				肝下面ドレイン排液量 mL 肝下面ドレイン排液性状		肝下面ドレイン排液量 mL 肝下面ドレイン排液性状
				尿量（尿道留置カテーテル）mL		尿量（尿道留置カテーテル）mL
指導・説明		入院・術前オリエンテーション		手術の結果説明		

