

ステップ名称	入院当日		手術前日		手術当日		術後前日	
	1日目		2日目		3日目		4日目	
患者状態			術前		術後		術後1日目	
			<ul style="list-style-type: none"> 手術経過に問題がない 安静が守れている 絶飲食が守れている 不安が表出できる 		<ul style="list-style-type: none"> 合併症の症状・所見がない 出血がない イレウスの症状がない 吻合不全の症状がない 		<ul style="list-style-type: none"> 合併症の症状・所見がない 出血がない イレウスの症状がない 吻合不全の症状がない 	
			<ul style="list-style-type: none"> 全身状態に問題がない バイタルサインに異常がない 		<ul style="list-style-type: none"> 全身状態に問題がない バイタルサインに異常がない 		<ul style="list-style-type: none"> 全身状態に問題がない バイタルサインに異常がない 	
知識・教育・理解	<ul style="list-style-type: none"> 入院生活について理解できる 不安が表出できる オリエンテーション内容を言える 		<ul style="list-style-type: none"> 入院生活について理解できる 不安が表出できる 					
処置	バイタル測定 1日1検		バイタル測定 1日1検		術前指示 剃毛		膀胱留置カテーテル抜去	
			術前指示 膀胱置		心電図モニター装着 (術翌日朝まで)		弾性ストッキング除去 (動ければ)	
					尿管 3時間毎		弾性ストッキング着用	
治療	1000mL ビーフリッド輸液		500mL ビーフリッド輸液		ソリューゲンF500m l (手術が2日以降の場合)		500mL ソルデム3A輸液	
	1000mL ビーフリッド輸液				ワタシゲ-トリカド静注用1g 大塚生食注【2ポート】 100mL		500mL ソルデム3A輸液	
					500mL ソルデム3A輸液		500mL ソルデム3A輸液	
注射					オメプラゾール注射用20mg 20ml 生食液NS		オメプラゾール注射用20mg 20ml 生食液NS	
					タガメット注射液200mg 20ml 生食液NS		タガメット注射液200mg 20ml 生食液NS	
					プリンペラン注射液10mg 20ml 生食液NS		プリンペラン注射液10mg 20ml 生食液NS	
内服	マゴロール (250mL/本)		マゴロール (250mL/本)		120mg グリセリン液「オクタ」		200mg セレコックス錠	
			ピロジール・カナマイシン 13時 14時 21時				200mg セレコックス錠	
							500mg カロナール錠	
検査							<ul style="list-style-type: none"> Bil D Bil AST (GOT) ALT (GPT) ALP LDH γ-GTP ChE Ga IP βUN Cre TP Alb Na K Cl CRP AMY CPK 血糖 BNP 血算 血沈 	
							<ul style="list-style-type: none"> Bil D Bil AST (GOT) ALT (GPT) ALP LDH γ-GTP ChE Ga IP βUN Cre TP Alb Na K Cl CRP AMY CPK 血糖 BNP 血算 血沈 	
							<ul style="list-style-type: none"> Bil D Bil AST (GOT) ALT (GPT) ALP LDH γ-GTP ChE Ga IP βUN Cre TP Alb Na K Cl CRP AMY CPK 血糖 BNP 血算 血沈 	
画像検査					[手術室] 腹部 臥位正面 術後 術後オンコールをお願いします		[術前] 胸部 臥位正面 [術中] 腹部 臥位正面 [術後] 腹部 臥位正面	
リハビリ								
栄養	朝から 朝：変更なし 昼：変更なし 夕：絶食		朝から 朝：絶食 昼：絶食 夕：絶食				朝から 朝：消化管術後流動食 昼：消化管術後流動食 夕：消化管術後流動食	
清潔	清潔ケア シャワー浴		清潔ケア シャワー浴		清潔ケア 洗面		清潔ケア 清拭 全身	
活動	安静度 院内フリー		安静度 院内フリー		安静度 絶対安静		安静度 病棟内フリー	
排泄								
観察項目					嘔気 出血 排泄色調		嘔気 出血 排泄色調	
					嘔吐		嘔吐	
					疼痛程度 (NRS)		排便ガス	
指導・説明	入院・術前オリエンテーション				手術の結果説明		食事開始時の栄養指導	

